

# SOCIALITES OPHTALMOLOGIQUES



2

NOUVEAUX COLLYRES  
BEAUCOUP DE ...



# Difénasol

Diclofénac Sodique 0,1% 5ml

- Douleurs &
- Inflammations de l'Oeil



**Un soulagement  
rapide & efficace**

# Difénasol

Diclofénac Sodique 0,1% 5ml

- \* **Efficace rapidement, en 1 à 2 heures, sur toutes les douleurs de l'œil**
- \* **Agit sur toutes les inflammations oculaires**
- \* **Traite les inflammations post-opératoires**
- \* **Diminue les douleurs post-opératoires**
- \* **Prévient les manifestations inflammatoires dues aux interventions chirurgicales de l'œil**

**L'anti-inflammatoire  
oculaire de référence**



# Difénasol

Diclofénac Sodique 0,1% 5ml

## PRESENTATION

collyre flacon de 5ml

conditionnement bottle pack

stérilité - efficacité - sécurité - fiabilité



## POSOLOGIE

Traitement de la douleur & de l'inflammation  
1 goutte 4 fois /jour

En pré-opératoire

1 goutte 4 fois, 2 heures avant l'intervention

En post-opératoire

1 goutte 4 fois /jour

## PRIX

coût social



# Soulage

# Difénasol

Diclofénac Sodique 0,1% 5ml

## Diclofénac 0,1% collyre

Antalgique anti-inflammatoire  
de première intention recommandé par  
L'OMS

Le réflexe Antalgique pour  
les Douleurs et inflammations  
de l'oeil.



## Indolore et bien toléré

# Néomdexsol

Néomycine 0,35% & Dexaméthasone Phosphate 0,1% 5ml

- Infections &
  - Inflammations
- ## Oculaires



**Prévenir & Traiter en urgence pour sécuriser l'oeil**

# Néomdexsol

Néomycine 0,35% & Dexaméthasone Phosphate 0,1% 5ml

- **Néom** = Néomycine
- **Dex** = Dexaméthasone
- **Sol** = Solution

**1 Collyre**

**2 Solutions**

- **Anti inflammatoire Puissant**
- **Anti infectieux efficace**

**1 combinaison adaptée**

**Quand le risque infectieux est:**

- plus grand
  - plus dangereux
- pour l'oeil**



# Néomdexsol

Néomycine 0,35% & Dexaméthasone Phosphate 0,1% 5ml

## ACTIF SUR TOUTES LES INFLAMMATIONS DU SEGMENT ANTERIEUR DE L'OEIL ET SES ANNEXES

**\*Conjonctivite inflammatoire**

- de la bulbe
- de la cornée
- du segment antérieur de l'oeil

**\*Réduction de l'œdème et de l'inflammation  
en cas de conjonctivite bactérienne**

**\*Sclérites et épisclérites**

**\*Uvéites antérieures et postérieures (signes inflammatoires)**

**\*Lésions de la cornée dues aux**

- produits chimiques & brûlures
- pénétrations de corps étrangers

**\*Kératites non infectieuses**

**\*Blépharites, orgelets, chalazion**

**\*Contusion du globe (tout signe)**

## EFFICACE SUR TOUTES LES INFECTIONS OCULAIRES

**\*Conjonctivite infectieuse: (G+ & G-)**

**\*Actif sur les germes les plus courants, responsables  
des infections oculaires**

# Néomdexsol

Néomycine 0,35% & Dexaméthasone Phosphate 0,1% 5ml

## PRESENTATION

collyre flacon de 5ml

conditionnement bottle pack

stérilité - efficacité - sécurité - fiabilité



## POSOLOGIE

**Affections aiguës**

1 à 2 gouttes toutes les heures

**Affections moins graves**

1 à 2 gouttes 4 à 5 fois / jour

## PRIX

Coût social



**Reflexe Antibiotique  
dans les conjonctivites saisonnières**