



PALUDISME et GROSSESSES



Pour une Prise
en Charge Urgente et Efficace
L'OMS décide du **TPI**



Maloxine

Sulfadoxine 500 mg + Pyriméthamine 25 mg comprimés

LA PRECONISATION DE L'OMS

AVANTAGES DU TPI

PREVENIR CHEZ:



FEMMES ENCEINTES

- PARASITEMIE ELEVEE
- SPLENO HEPATOMEGALIE
- MANIFESTATIONS CLINIQUES



FOETUS

- AVORTEMENT
- MORTALITE
- INFECTIONS CONGENITALES



NOUVEAU NE

- PREMATURE
- PETIT POIDS DE NAISSANCE
- RETARD DE CROISSANCE INTRA-UTERINE

PROTOCOLE DU TPI

3 COMPRIMES EN 1 PRISE UNIQUE

16ème SEMAINE (4 mois).....1ère Prise


28 à la 32ème SEMAINE (7 à 8 mois).....2ème Prise

4 Semaines (1 mois) après la 2ème Prise....3ème Prise

(3ème Prise Reservée aux femmes enceintes séropositives)

Conception

(Paludisme pendant la grossesse)



Maloxine

Sulfadoxine 500 mg + Pyriméthamine 25 mg comprimés

LA REFERENCE SIMPLEMENT

LA REponse RECOMMANDEE

En cas de PALUDISME simple:



prevention et traitement chez les sujets a risque

- Femmes Enceintes
- Enfants
- Sujets agés



une efficacite en 4 points

- 1 PRISE UNIQUE
- 2 PRINCIPES ACTIFS
- 3 COMPRIMES SECABLES
- 4 SEMAINES D'EFFICACITE (CLINIQUE ET PARASITOLOGIQUE)



posologie & prix

